

# + Epidémiologie Périnatale



## Cannabis

### Les usages chez les femmes <sup>1</sup>



37,2 %

Expérimentation  
chez les 15-64 ans

19 %

Usage actuel\*  
chez les 18-25 ans

7,1 %

Usage actuel\*  
chez les 18-64 ans

\*Usage dans l'année (ou usage actuel) : au moins un usage au cours des 12 mois précédant l'enquête

### Les usages chez les femmes enceintes et leur conjoint



Substance illicite la plus consommée pendant la grossesse <sup>2</sup>

2,1 %

Des femmes ont déclaré avoir consommé du cannabis pendant leur grossesse dont : <sup>2</sup>

42,1 % < 1 fois / mois

14,6 % 1 à 2 fois / mois

43,3 % > 3 fois / mois



95 % Des consommatrices ont un entourage/conjoint lui-même consommateur. <sup>3</sup>



22 % De l'ensemble des femmes enceintes ont un conjoint consommateur. <sup>3</sup>

### Les risques chez le fœtus & le nourrisson

Mêmes risques que pour le tabac, car consommations associées

- Accouchement prématuré : 13 % <sup>4</sup>
- RCIU : 22 % <sup>4</sup>
- Troubles rythme cardiaque fœtal : 6 % <sup>4</sup>
- Syndrome Sevrage Néonatal : 4 % <sup>4</sup>
- 2 fois plus d'admission en néonatalogie chez les nourrissons exposés <sup>4</sup>
- Les nourrissons exposés seraient 35 % plus susceptibles de mourir dans l'année suivant la naissance que les nourrissons non exposés. <sup>5</sup>
- Risque d'intoxication pédiatrique accidentelle passive ou ingérée : <sup>6</sup>
  - 71 % des enfants de moins de 6 ans présentant une intoxication accidentelle sont âgés < 18 mois,
  - 27 hospitalisations en réanimation sur 194 cas entre 2015 et 2017 en France
- Présence de cannabinoïdes dans 63 % d'échantillons de lait maternel recueillis jusqu'à 6 jours après dernière consommation <sup>7</sup>

### Méconnaissance des risques

Entre 34 et 60 % des consommatrices poursuivent l'usage de cannabis durant la grossesse, sans vraiment connaître les risques qu'elles encourent. <sup>8</sup>

<sup>1</sup> OFDT - site web rubrique cannabis/consommation - consulté mai 2022

<sup>2</sup> INSERM et DREES. Enquête nationale périnatale. Rapport 2016

<sup>3</sup> Etude cohorte de femmes enceintes marseillaises - DUMAS 2018

<sup>4</sup> Réseau des centres d'addictovigilance (Centre Poitiers et ANSM) décembre 2020

<sup>5</sup> Etude cohorte californienne 2001-2012 - article Addictaïde juillet 2021 :

<sup>6</sup> In-dépendance n°28, CEIP-A Nantes octobre 2019

<sup>7</sup> Bertrand et al. Pediatrics, 2018

<sup>8</sup> Dumas et al. Grossesse et usage de substances psychoactives en France. Synthèse de la littérature. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 2014; 43 : 649-656. & The American College of Obstetricians and Gynecologists. Marijuana use during pregnancy and lactation. Octobre 2017, 722

Remerciements pour leur contribution aux membres du groupe de travail régional "Formation"