



Plaquette rédigée par le centre  
d'addictovigilance de Marseille

## INTÉRÊT D'UNE DIFFUSION LARGE DE NALOXONE

# POURQUOI DIFFUSER LA NALOXONE ?

- Les **OPIOÏDES** sont impliqués dans la majorité des décès liés à l'abus de substances (Données DRAMES 2019)
- Dans de nombreux cas, les surdoses d'opioïdes ont lieu en présence d'un **TÉMOIN**
- La **NALOXONE**, l'**ANTIDOTE spécifique aux opioïdes**, est disponible sous formes nasale ou intra-musculaire utilisables par tous (Ministère des solidarités et de la santé)
- Parmi les consommateurs d'opioïdes, **SEUL 1/5 avait de la naloxone à sa disposition** (Données OPPIDUM 2020)

### LES 3 SIGNES D'UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES



#### DÉPRESSION RESPIRATOIRE

Respiration faible ou irrégulière  
< 10 respirations par minute  
Lèvres et ongles bleus



#### TROUBLES DE LA CONSCIENCE

Sédation  
Coma  
Pas de réaction au bruit ou au toucher



#### MYOSIS (PUPILLES RÉTRÉCIES)

MAIS signe souvent masqué par prise concomitante d'autres substances

## DEUX FORMES DE NALOXONE DISPONIBLES

### NASALE



**NYXOID®**

Contenu des kits

1 kit = 1 surdose

Demander un nouveau kit après utilisation

- 2 pulvérisateurs
- Une notice
- Un guide d'initiation rapide imprimé au dos

- 1 seringue pré-remplie
- 2 aiguilles à assembler
- Une notice
- Une boîte en plastique rigide

### INJECTABLE INTRA MUSCULAIRE



**PRENOXAD®**

	<b>NYXOID®</b> <i>Depuis septembre 2021</i>	<b>PRENOXAD®</b> <i>Depuis juin 2019</i>
Indication thérapeutique	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de <b>14 ans</b>	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de <b>18 ans</b>
Conditionnement	2 pulvérisateurs 1 dose par pulvérisateur <b>2 doses disponibles</b>	Une seringue pré-remplie 1 dose par graduation <b>5 doses disponibles</b>
Modalités d'administration	Appeler les secours (15 ou 112) 1 <sup>ère</sup> dose 2 <sup>ème</sup> dose si pas d'amélioration après 2 à 3 minutes	
Conditions de prescription	Liste I <i>Prescription médicale <b>obligatoire</b></i>	Liste I <i>Prescription médicale <b>facultative</b></i>
Lieux de dispensation	En pharmacie d'officine En CSAPA A l'hôpital	En pharmacie d'officine En CSAPA & <b>CAARUD</b> A l'hôpital
Prix et remboursement	31,40€ TTC Taux de remboursement : 65%	22,16€ TTC Taux de remboursement : 65%
Commande	Auprès du dépositaire CSP (par mail : pharmacie@csp-epl.com ou par fax : 09 71 00 70 35)	Auprès des différents grossistes répartiteurs
Formation et informations	« Une heure pour apprendre à sauver une vie » sur <a href="http://naloxone.fr">naloxone.fr</a> « Surdoses (overdose) d'opioïdes : la naloxone est utilisable par tous et peut sauver la vie » sur le <a href="http://site.du.ministere.des.solidarites.et.de.la.sante">site du ministère des solidarités et de la santé</a>	
	<a href="https://www.mundipharma.fr/nos_medicaments/antidote">https://www.mundipharma.fr/nos_medicaments/antidote</a>	<a href="http://prenoxad.fr">prenoxad.fr</a>


# NYXOID® QUELLES DIFFÉRENCES AVEC NALSCUE® ?

Nalscuc®, forme nasale, a été disponible de juillet 2016 à décembre 2020. Quelques différences sont à noter :

	NYXOID®	NALSCUE®
Pulvérisateurs par boîte	2	4
Dose par boîte	2	
Administration	1 dose = 1 pulvérisation dans <b>une seule narine</b> (1 dose = 1 pulvérisateur dans une narine = <b>1 pulvérisateur</b> )	1 dose = 1 pulvérisation dans <b>chaque narine</b> (1 dose = 1 pulvérisateur différent pour chaque narine = <b>2 pulvérisateurs</b> )
Âge minimum	A partir de <b>14 ans</b>	A partir d' <b>1 mois</b>
Modalités d'administration	Administer la 2 <sup>ème</sup> dose après <b>2 à 3 minutes</b> sans amélioration. Pulvériser <b>dans l'autre narine</b> si possible	Administer la 2 <sup>ème</sup> dose après <b>4 à 5 minutes</b> sans amélioration. Pulvériser de nouveau <b>dans chaque narine</b>
Modalités de prescription	Prescription <b>obligatoire</b>	Prescription <b>facultative</b>

## RÉAGIR À UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES

- 1 APPELER les secours (15 ou 112)**
- 2 ADMINISTRER UNE DOSE** de naloxone Prenoxad® ou Nyxoid®
- 3 SURVEILLER LA RESPIRATION**
- 4 RÉADMINISTRER** une dose si absence d'amélioration au bout de 2/3 min
- 5 PLACER** le patient en **Position Latérale de Sécurité** et **SURVEILLER en attendant les secours**



## À QUI DIFFUSER LA NALOXONE EN PRIORITÉ ?

**AUX PERSONNES À RISQUE DE SURDOSE AUX OPIOÏDES ET A LEUR ENTOURAGE**

### QUI ?

- Consommateurs d'opioïdes : de **MEDICAMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIOIDES (MSO)**, de **MEDICAMENTS OPIOIDES ANTALGIQUES**, de **SUBSTANCES OPIOIDES ILLICITES**

### QUELLES SONT LES PRINCIPALES SITUATIONS A RISQUE ?

- INITIATION** d'un traitement (MSO ou opioïde antalgique)
- PERTE DE TOLÉRANCE** après arrêt ou diminution des prises d'opioïdes
- Usages **À RISQUE/MESUSAGE** (poly-consommations, injection, augmentation des doses, recherche d'effets psychoactifs...)
- DÉPENDANCE**
- ANTÉCÉDENT** récent de surdose aux opioïdes
- Usage **RÉCRÉATIF** notamment chez des sujets naïfs d'opioïdes
- Usage en « **AUTO SUBSTITUTION** » pour soulager une opio-dépendance
- INTOXICATION ACCIDENTELLE** (enfants, adolescents, adultes)

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les médicaments et substances psychoactives, pour toute déclaration de cas d'abus ou de pharmacodépendance

### Centre d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance CEIP- Addictovigilance de Nantes

Service de Pharmacologie Clinique

Institut de biologie

9 quai Moncoussu

44093 Nantes Cedex

Tel : 02 40 08 40 73/81

Mail : [pharmacodependance@chu-nantes.fr](mailto:pharmacodependance@chu-nantes.fr)

Chef de Service, PU-PH : Eric DAILLY

Responsable, PU-PH : Caroline VICTORRI-VIGNEAU

Praticiens : Marie GERARDIN, Marylène GUERLAIS, Aurélie AQUIZERATE, Edouard LAFORGUE, Marion ISTVAN

Attachés de Recherche Clinique : Morgane ROUSSELET